

## **11- Caracterización clínica de lesiones varicosas bucales y su asociación con condiciones médicas.**

*Lazos JP, Rodríguez E, Piemonte E, Romero JC, Panico RL, jerolazos@gmail.com*

*Cátedra de Estomatología A – Facultad de Odontología UNC*

**Introducción:** las Várices bucales (VB) son lesiones frecuentes en adultos mayores, aunque pueden presentarse en otros grupos etarios. Además, se las ha descrito en relación a diferentes cuadros médicos. Sin embargo, la evidencia es escasa e inconsistente. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar VB en relación a género, edad, simetría, ubicación y cuadros sistémicos asociados. **Métodos:** se revisaron pacientes mayores de 18 años que concurren a la Cátedra de Estomatología “A”, Facultad de Odontología (UNC). Se utilizó una ficha clínica ad hoc y toma de fotografías clínicas. El examen fue realizado por profesionales calibrados ( $\kappa > 0,60$ ) entre 2009 y 2016. **Resultados:** Se encontraron VB en 46% de los pacientes revisados de los cuales el 58,46% eran mujeres y el 41,54% hombres ( $n=672$ ). Se encontró mayor frecuencia de VB en el grupo de mayor edad (+40 años). Las VB fueron asimétricas, en contraposición con el aspecto normal de las raninas. Los cuadros sistémicos asociados a VB fueron hipertensión arterial, consumo de tabaco, presencia de varices en miembros inferiores y otros. **Conclusiones:** encontrar VB en el examen bucal podría ser utilizado como indicador de cuadros sistémicos tales como hipertensión arterial, diabetes, hemorroides, insuficiencia cardíaca e hipertensión portal.

*PALABRAS CLAVE: várices bucales - criterios clínicos - cuadros sistémicos.*

