PAMPEANO

Tipo Comercial: Morado

Obtención: 2010

Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Universidad Nacional de Córdoba

Origen: población de origen "asiático".

Inscripción: 12.500

Instituto Nacional de Semillas (INASE)



- **Grupo Fisiológico:** IIb (bajos requerimientos de frío y mediano fotoperíodo largo para bulbificar). Área foliar de 540 cm^2 en bulbificación (mediados de setiembre), para plantas provenientes de semilla de 5 g.
- **Planta:** porte erecto, de gran altura, con hojas anchas de color verde intermedio, con vara floral (*hardneck*), en época temprana. Moderada capacidad como donante de bulbillos aéreos (115 útiles por planta). Moderadamente sensible a la expresión de "rebrote" en plantaciones tardías.
- **Bulbo:** grande (60/64 mm de diámetro y 63/68 g), de forma globosa y achatada, irregular, con dientes que no cierran sobre el tallo floral; disco radical plano a algo hundido, con hojas envolventes de color rosado variegadas; Peso Específico Relativo medio (1,05).
- **Dientes:** 13 grandes de color blanco cremoso, castaño claro, rosado o violáceo. Tamaño grande 6 g; mediano 4,8 g; chico 3 g y muy chico 1 g.
- **Ciclo:** 210 días (entre principios de marzo y mediados de octubre).
- **Rendimiento:** alto (18.500 kg/ha de ajos secos, cortados y limpios), con más del 70% de calibres superiores a 50 mm en densidades de 350.000 plantas/ha en líneas simples, tamaño mínimo de semilla de 3 g, fertilizaciones nitrogenadas de 100 kg/ha y 28 riegos por superficie.
- **Conservación frigorífica:** escasa.
- **Características sanitarias:** tolerante a *Penicillium* sp.
- **Características organolépticas:** olor y sabor muy suave, apto para aderezar ensaladas.
- **Características industriales:** bajos niveles de sólidos solubles (28%), apto para conservación como pelado, aunque de pelado muy dificultoso. Los procesos industriales mejoran la tolerancia digestiva del producto fresco.

OBTENTORES: Ávila, G.T.; Bima, P.J.; Boetto, M.N