

Tasas de Incidencia y Mortalidad por cáncer bucal. Córdoba, Argentina (período 2004-2013)

*Berasategui L, Morelatto R.A, Belardinelli P, Bolesina N, Lopez de Blanc S.A

Existe una gran variabilidad en las tasas de incidencia (TI) y mortalidad (TM) por cáncer bucal (CB) en las diferentes regiones del mundo. Analizar los datos existentes sobre el CB en la población de la Provincia de Córdoba y comparar las TI y TM puede contribuir al conocimiento de la etiología de esta patología, a identificar a los grupos vulnerables y así permitir planificar políticas de salud preventivas y/o asistenciales.

OBJETIVO: Estudiar la TI y TM por CB en la Provincia de Córdoba en el período 2004-2013, compararla con otras poblaciones del mundo y con el mismo análisis realizado previamente del período 1975-2000.

MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional analítico transversal de las TI y TM por CB en la Provincia de Córdoba y en Argentina. Para recolectar y analizar los datos se utilizaron los registros oficiales de la Dirección de Estadísticas socio-demográficas del Departamento de Estadísticas, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el Globocan 2012 (IARC). La información recolectada se comparó con un estudio previo realizado en la Provincia de Córdoba en el período 1975-2000 (Morelatto y col, 2006).

RESULTADOS: Las TI ajustadas por edad en la Provincia de Córdoba fueron de 6,6 y 2,6 para varones (V) y mujeres (M) respectivamente en 2004, bajando ligeramente a 5,2 y 1,9 (V/M) en el año 2013. El sitio más frecuente en V fue la lengua y en M otras localizaciones de la boca. En relación a la edad, si bien predomina entre 50 y 65 años, se observó un comportamiento diferente entre ambos sexos. Las TM en Córdoba por CB se mantuvieron en el 50% en este período estudiado (2004-2013), con un resultado similar al del estudio previo (1975-2000). Al comparar la TM por CB entre distintos países en los últimos 30 años, se observó que Argentina ocupa el segundo lugar de Sudamérica luego de Brasil; sin embargo en Brasil se ha incrementado el número de defunciones. **CONCLUSIONES:** Si bien vemos una tendencia a disminuir la TI de CB en Córdoba, la TM se mantuvo estable en todos los períodos estudiados. Es por esto que debemos focalizarnos en informar a la población sobre esta patología por medio de campañas que apunten a la prevención primaria (disminución del consumo de tabaco, alcohol y mejoramiento del estado bucal) y al diagnóstico precoz.