

Dres. O. COROMINAS VILLAFANE y R. A. CUESTAS CARNERO

Ry Corominas
2

F
D73
C822

EXTRACCIONES MULTIPLES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
BIBLIOTECA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

★

F
D73
C822

7297

EXTRACCIONES MULTIPLES

DRES. OSCAR COROMINAS VILLAFAÑE (1) Y RICARDO A. CUESTAS CARNERO (2)

FRENTE al problema considerable que crea la escasez de camas en los servicios hospitalarios, y considerando que la agilización de todos los mecanismos que tiendan a acelerar el alta de los enfermos hospitalizados, puede contribuir a mejorar este estado de cosas, creemos útil poner a consideración de los médicos en general y en especial de los que están vinculados a servicios con internación, el procedimiento de las extracciones múltiples en una sola sesión, tan difundida ya en los medios hospitalarios modernos y cuya realización está al alcance de cualquier profesional más o menos avezado.

Este procedimiento está avalado por conceptos referidos a enfermo y tiempo. Consideraremos primero lo referente a éste, por estar más en relación con el motivo de esta pequeña comunicación.

Con un ejemplo haremos el asunto más demostrativo: el paicente N. N. necesita ser puesto en condiciones para ser sometido a una gastrectomía parcial; presenta en su cavidad bucal un proceso de policarías que incluye 20 piezas dentarias con necrosis de sus pulpas y reacciones periapicales de diversa índole. Se indica la extracción de las piezas dentarias y sus procesos. Con los procedimientos de rutina, enfrentamos el problema realizando las extracciones en bloques de 4 piezas por sesión con intervalo entre una y otra de dos días como mínimo.

Actuando en esta forma tendríamos el siguiente cálculo de tiempo:

- 1er. día: 4 extracciones.
- 4º " : 4 extracciones.
- 7º " : 4 extracciones.

10º " : 4 extracciones.

13º " : 4 extracciones.

Vemos así, que distraemos 13 días al enfermo para la realización de 20 extracciones.

Comparemos ahora en el mismo ejemplo el tiempo que necesitaremos con el segundo procedimiento:

1er. día: Preoperatorio.

2º " : Realización de la intervención (las 20 piezas dentarias en la misma sesión).

3er. día: Cuidados post-operatorios.

4º " : Cuidados post-operatorios.

Total 4 días de distracción al enfermo.

De la comparación entre uno y otro procedimiento tenemos como resultante, un ahorro de 9 días.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA.

1º) Anestesia general con intubación nasal y "packing" faríngeo colocado cuidadosamente para evitar aspiración de los elementos a remover o sangre.

2º) Incisión contorneando el cuello de las piezas dentarias a extraer por vestibular y lingual.

3º) Decolado de la mucosa vestibular y palatina o lingual.

4º) Osteotomía moderada (más o menos un margen de 3 mm.) de la cortical vestibular, aliviando así el esfuerzo que requiere la extracción y evitando el peligro de fracturas.

5º) Extracción de las piezas dentarias.

6º) Redondeado de las crestas interdentarias y tabiques interradiculares.

(1) Belgrano 552. Córdoba (Arg.).

(2) Alvear 47. Córdoba (Arg.).

7º) Toilette cuidadoso.

8º) Sutura continua o interrumpida.

Las consideraciones anteriores corresponden al factor tiempo. Veamos ahora las que conciernen al paciente. Diremos primero que el solo hecho de acortar la permanencia del enfermo en el hospital, ya significa para él una ventaja extraordinaria. En cuanto al dolor hemos podido comprobar, como lo atestigua la estadística que a continuación presentaremos, su ausencia en los post-operatorios, condicionada por los redondeados de crestas óseas y sutura posterior que lo aísla del medio bucal, impidiendo la formación de pequeños focos osteíticos en las crestas alveolares e interradiculares, que con las extracciones de rutina pueden quedar expuestas.

Parece paradójal el hecho de que 20 extracciones, resultan a veces menos molestas que un grupo de 3 ó 4, pero la distinta téc-

nica usada en uno y otro caso, pone en claro justificando perfectamente lo dicho anteriormente.

Otra ventaja extraordinaria es la posibilidad de solucionar integralmente su problema oral, pues permite la colocación en el mismo acto operatorio de las prótesis respectivas, por procedimientos que no es del caso mencionar aquí; el enfermo puede pues entrar a la sala de operaciones en las condiciones que exigen la extracción de todas sus piezas dentarias y salir de ella con sus prótesis parciales o totales colocadas.

Por último, citaremos el alivio que significa para el enfermo, el hecho de ser sometido a un solo trauma quirúrgico.

Se presenta la estadística de 11 casos realizados por el procedimiento preconizado en esta comunicación, todos ellos en el Hospital Córdoba, efectuando el estudio comparativo del factor tiempo.

HISTORIA CLÍNICA N°	CASO	EDAD	SEXO	INDICACION	PRE-OPERATORIO	FECHA DE INTERVENCIÓN	PIEZAS EXTRAÍDAS	CONTROL POET-OPERATORIO	FECHA DE ALTA	TIEMPO EM- PLEADO PARA SOLUCIONAR EL CASO	TIEMPO POSI- BLE POR EX- TRACCIÓN EN BLOCK DE 4 ELEMENTOS
292	1	39	M	Eliminación focos sépticos (Policaries).	Penicilina y Streptomina.	29-XII-1955	27	Bueno. Ligeras hemorragias. Penicilina y Streptomina.	2-I-1956	4 días	21 días
295	2	30	F	Eliminación focos sépticos (Policaries).	Penicilina y Streptomina.	7-I-1956	28	Bueno. Ligero edema. Penicilina y Streptomina.	11-I-1956	4 días	21 días
298	3	35	F	Eliminación focos sépticos (Policaries).	Penicilina y Streptomina.	17-I-1956	25	Bueno. Ligero edema. Penicilina y Streptomina.	21-I-1956	4 días	21 días
349	4	40	F	Eliminación focos sépticos (Policaries).	Penicilina y Streptomina.	30-VIII-1956	18	Bueno. Penicilina y Streptomina.	3-IX-1956	4 días	15 días
403	5	21	F	Protrusión alveolar superior	Despaciina.	8-IV-1957	24	Pequeño dolor durante el primer día. - Bueno.	12-IV-1957	4 días	18 días
407	6	3	F	Policaries.	Despaciina.	9-V-1957	13	Bueno. 1 coagulante Beta.	10-V-1957	1 día	12 días
411	7	37	F	Policaries y paradentosis	Penicilina y Streptomina.	11-V-1957	22	Bueno. Penicilina - Streptomina. 1 coagulante.	14-V-1957	3 días	18 días
434	8		F	Eliminación focos sépticos (Paradentosis).	Penicilina y Streptomina.	18-VII-1957	22	Bueno. Penicilina - Streptomina. Buches.	24-VII-1957	6 días	18 días
477	9	47	F	Caries y paradentosis	Terramicina 1 c. 18 hs.	11-X-1957	13	Ligero edema. Terramicina. 1 cada 18 horas.	16-X-1957	5 días	12 días
513	10	38	F	Paradentosis.	Benzetacil 3-3	28-I-1958	8	Pequeño dolor en la zona de premolares inferiores, atribuible al trauma operatorio por fractura del elemento dentario.	31-I-1958	3 días	6 días
535	11	49	M	Policaries.	Penicilina y Streptomina.	3-IV-1958	15	Bueno.	7-IV-1958	4 días	12 días