

190

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD
GALLINA F, RACCA* A, EGEA I, GAMBA L, MERCADO J.

192

SITUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL VALLE DE TULUMBA.
ACUÑA COTRONEO C O, ARBELO D C, BELTRAN N M, CASTRO D, VARGAS C L, DI LIDDO D M, FLORES SUAREZ M A, PRATTO J B, ACUÑA CASTRO O, URTEAGA S, LOPEZ SCALLA R, OCHOA ROMERO M V, MARTELLOTTI M C

194

INFORMACIÓN Y CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN MUJERES DE LA OBRA SOCIAL UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA
GARCÍA A, AGUIRRE J, CECCHETTO E, ROITTER* C, LOPEZ A, BERNET J

195

MANSONELLOSIS EN LAS PROVINCIAS DE JUJUY Y TUCUMÁN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PIZZI HL, DEGESE MF, GUARNERA E, CABRERA M, TOMÁS AF, FERRERO MR, PÁEZ REARTE MG, PIZZI RD

197

CARACTERIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE CONSULTAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS.
VILLACÉ* MB, LÓPEZ DE NEIRA MJ, REGINATO G, RUIZ ESPAÑO A, ABELDAÑO A, BURRONE MS, ENDERS J, FERNÁNDEZ AR.

198

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN EN ESPACIOS DE CONSEJERÍA NUTRICIONAL EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE EXTENSIÓN. CÁTEDRA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA. ESCUELA DE NUTRICIÓN. UNC. CÓRDOBA, 2013.
SCRUZZI G, BARBERO L, MARTINA D.

200

SCREENING DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES AMBULATORIOS EN UN HOSPITAL GENERAL.
ALISCIONI A, CARIGNANO M, CHIAVASSA Y, IGARZABAL P, SANSÓN S.

201

ANÁLISIS DE LA OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA FRENTE AL CONSUMO Y DESPENALIZACIÓN DE LA MARIHUANA.
ACTIS DANNA, ZAIEG R. N., TAPIA STACAMPIANO L.A. ATIENZA OA, MARTINEZ HD, ACEVEDO GE.

202

EVALUACIÓN DEL RIESGO LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
FARIAS MA, DEMARIA MJ, ALVAREZ LOYAUTE G, ACEVEDO GE

204

DROGAS MÁS CONSUMIDAS POR LOS ADOLESCENTES
GONZÁLEZ, A; MIRANDA, ME; SÁNCHEZ, M; TARQUINI, F; ATIENZA OA, MARTINEZ HD. ACEVEDO GE.

205

USO INDEBIDO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
ALDERETE M, BRIZUELA DEL MORAL L, DEMARCO VEDELAGO A, IREBA A, MOSSO F, ATIENZA OA, MARTINEZ HD, ACEVEDO GE.

206

AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
BAZÁN M, CARDOZO CMJ, CÓRDOBA LH, VIGLIONE JM, VILLALBA JA, ATIENZA OA, MARTINEZ HD. ACEVEDO GE.

1527 -

INFORMACIÓN Y CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN MUJERES DE LA OBRA SOCIAL UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

GARCÍA A, AGUIRRE J, CECCHETTO E, ROITTER C, LOPEZ A, BERNET J*

Unidad de Apoyo Farmacología Aplicada HTCA CFE y URM ESP FCM UNC

La disponibilidad e información de métodos anticonceptivos permiten a la mujer planificar su maternidad. Los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos adversos graves poco frecuentes. Etinilestradiol+levonorgestrel tienen el mejor perfil beneficio/riesgo según guías de práctica clínica. Nuestro objetivo fue medir consumo de anticonceptivos en mujeres entre 15 y 55 años (2010) a partir de la base de datos de ventas de DASPU Obra Social Universitaria de Córdoba y valorar información de usuarias y no usuarias con encuesta validada a mujeres entre 15 y 55 años (2012). Se analizaron 8.535 compras de anticonceptivos hormonales (2010). Los más consumidos etinilestradiol+gestodeno (48,3%) etinilestradiol+drosipirenona (27,5%). Mayor consumo entre 15 y 34 años. Se completaron voluntaria y anónimamente 349 encuestas. Edad promedio 32 ± 10 . La edad fue menor en usuarias vs no usuarias (28 y 35,3 años respectivamente). Inicio relaciones sexuales 18,9 años (n=331). Edad al primer hijo 25,9 (rango 14 y 43). Se observó un mayor consumo de anticonceptivos orales (ACO) entre las que tuvieron el primer hijo a menor edad y la edad más temprana de inicio de relaciones sexuales y menor edad al primer hijo se asoció con educación básica incompleta. Las mujeres sin hijos consumían más ACO que las con hijos 60,8% vs 39,2% $p=0,0004$. Las usuarias manifestaron escaso conocimiento de contraindicaciones absolutas de ACO. Con respecto a anticonceptivos de emergencia (ACE), el 38,7 manifestó haberlo usado alguna vez. El 97,6% de ellas identificó correctamente la ventana temporal para su uso. Los ACO más consumidos fueron de tercera y cuarta generación, esto de lo recomendado por mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Las mujeres tienen información insuficiente y de escasa calidad. El ser usuaria no implica poseer mayor información. La salud sexual y reproductiva requiere un trabajo en equipo que involucre a la mujer para tomar sus decisiones para la maternidad