



## Simposio Internacional Programa RAICES Red de Científicos Argentinos en el Noreste de EE.UU. "Ganando la guerra contra el cáncer".

*Aula Magna- Pabellón 2- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales –  
Universidad de Buenos Aires. 12 y 13 de Mayo de 2016. Buenos Aires,  
Argentina.*

### 81. ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO Y HÁBITOS RELACIONADOS AL CÁNCER BUCAL EN LA POBLACIÓN ADULTA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

Sauchelli V\*, Criscuolo MI, Mossman J, Cuffini C, Zapata M, Belardinelli P Morelatto R, López de Blanc S. Cátedra de Estomatología B, Facultad de Odontología. Instituto de Virología, Facultad de Ciencias Médicas UNC.

Introducción: El cáncer bucal es considerado un serio problema de salud y se ve influenciado por diferentes factores: tabaco, alcohol y otros como el consumo de mate, el mal estado bucal, las infecciones por hongos, virus del papiloma humano (HPV), inflamaciones crónicas, trauma crónico entre otros. Objetivo: analizar la presencia de factores de riesgo para el CB y la prevalencia de lesiones estomatológicas. Métodos: se analizaron 401 Historias Clínicas de voluntarios que participaron en un estudio epidemiológico de relevamiento de salud bucal. Se analizó la prevalencia de factores de riesgo: consumo de tabaco, mate (temperatura), alcohol (cantidad y tipo de bebida), prevalencia de HPV y presencia de lesiones estomatológicas. Resultados: de los datos analizados el 62% correspondió al sexo femenino, con una edad promedio de 40 años y un rango de 18-87. El 42% eran fumadores, con un promedio de consumo de 80.000 cigarrillos en la vida. El 45 % consume bebidas alcohólicas, promedio de 320.000 g, siendo las más frecuentes el vino seguido por la cerveza y el fernet. El 76% toma mate, entre 500 y 1000 mL diarios y la mayoría lo bebe caliente. El 91% de los voluntarios manifestaron algún hábito, el 35% presentaba un solo hábito; el 39% de los voluntarios combinaba 2 hábitos y el 17% consumía tabaco, alcohol y mate. Se determinó la presencia del virus del HPV en el 3,4% de los individuos: 7 mujeres y 6 hombres; el 77% presentó alguna lesión estomatológica la mayoría relacionada al trauma crónico, y en el 85% de los casos se asociaron a otros factores de riesgo. Conclusión: El relevamiento de factores de riesgo evidenció un alto porcentaje de personas expuestas a factores de riesgo, lo cual nos revela la necesidad de implementar campañas de prevención. Palabras claves: TABACO-ALCOHOL-HPV-FACTORES DE RIESGO-EPIDEMIOLOGIA.

Subsidiado por SPU Res: 192/13 y SeCyT UNC RES: 165/14