



165

ID 362

### ESTUDIO DE TRASTORNOS ORALES POTENCIALMENTE MALIGNOS (TOPM) DURANTE DOS PERÍODOS

\*Silvia Adriana López de Blanc, Belardinelli Paola, Caciva Ricardo, Robledo Graciela, Bachmeier Evelin, Chaguri Guadalupe, Valdez Jesica, Morelatto Rosana.  
Estomatología B Dpto Patología Bucal FO UNC

**Objetivo/s** Analizar las características de los TOPM en dos períodos: 1995- 2003 (PI) y 2009- 2017 **Materiales y Métodos** Se recopilaron un total 12465 historias clínicas de pacientes atendidos en Estomatología “B” (FOUNC) en los dos períodos antes mencionados: 8004 para el PI y de 4461 en el PII. Se excluyeron aquellas incompletas y/o duplicadas. Se clasificaron según criterios del consenso OMS 2020 y se analizó la distribución de los TOPM según edad, sexo, consumo de tabaco y de alcohol y el diagnóstico estomatológico. Se aplicó test chi cuadrado y OR. **Resultados** Tanto en el PI como en el PII, predominó el sexo femenino con un 63 y un 62% respectivamente; la edad promedio fue de 41 y 56 años, en PI y PII y un rango de 3 meses a 96 años en ambos períodos. Los TOPM constituyeron el 18% (PI) y el 15,5% (PII) de las consultas. Los más prevalentes fueron la leucoplasia (L) 631(45%) en el PI y el liquen oral junto a las lesiones liquenoides orales (LO y LLO) en el PII n:164 (47%), y en 3er lugar las queilitis en ambos períodos con un 24 y un 18% respectivamente. En cuanto a la distribución por sexo en la leucoplasia, predominó el masculino (76%) mientras en el LO-LLO el femenino (72%). En relación a los al consumo de tabaco éste fue más frecuente en las leucoplasias (92 y 96%) ( $p<0,05$ ), el resto de los TOPM superaron la media de consumo de la población estudiada que fue del 49% en ambos períodos. **Conclusión/es** La fuerte asociación del consumo de tabaco con TOPM nos alerta y preocupa. Se hace necesario continuar con la concientización de la población sobre sus efectos nocivos sobre la salud en general y de la boca en particular.