

Muestra enviada por el Dr. Olsacher

Células silicificadas de gramíneas: gran cantidad, predominando en la muestra.

Crisostomatáceas: frecuentes

Diatomeas:

Achnanthes inflata Kütz.
Cocconeis placentula Ehr.
Cocconeis placentula var. *euglypta* Ehr.
Cymbella cymbiformis (Kütz) Bréb.
Encionema turgida (Greg.) Clev.
Epithemia zebra (Ehr.) Kütz.
Gomphonema acuminatum Ehr.
Gomphonema constrictum Ehr.
Gomphonema intricatum Kütz.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.
Hantzschia amphioxys var. *major* Grun.
Hantzschia amphioxys var. *xerophila* Grun.
Melosira italica (Ehr) Kütz.
Navicula Charlati Per.
Navicula exigua Greg.
Navicula minima Grun.
Navicula peregrina (Ehr.) Kütz.
Navicula placentula var. *rostrata* A. Mey.
Navicula radiosa Kütz.
Nitzschia denticula Grun.
Pinnularia borealis Ehr. (frecuente)
Pinnularia gibba Ehr. (frecuente)
Pinnularia neuquina Fr.
Rhopalodia gibba var. *ventricosa* (Ehr.) Grun.
Synedra ulna (Nitzs.) Ehr.
Surirella robusta
Stauroneis phoenicenteron Ehr.

Lago pantanoso, de aguas someras, en vías de secamiento y cubierto por gran cantidad de vegetales, principalmente de epífitas. Lugar topográficamente un poco alto.